

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

ANGIN-HEEL® SD
comprimate sublinguale

Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova: nr. 18005 din 23.07.2012

Denumirea comercială
Angin-Heel® SD

Compoziția

1 comprimat sublingual conține:

substanțe active: Apis mellifica D4 – 30 mg, Arnica montana D4 – 30 mg, Atropa belladonna D4 – 60 mg, Hepar sulfuris D6 – 60 mg, Hydrargyrum bicianatum D8 – 30 mg, Phytolacca americana D4 – 30 mg;

excipienți: stearat de magneziu, lactoză.

Forma farmaceutică

Comprimate sublinguale

Descrierea medicamentului

Comprimate rotunde cu margini teșite, de culoare de la alb până la galben-pal, fără miros.

Grupa farmacoterapeutică

Preparat homeopat.

Proprietăți farmacologice.

Preparatul posedă acțiune antiinflamatoare, antiseptică și dezintoxicantă. Acțiunea preparatului se bazează pe activarea capacităților protectoare ale organismului uman și restabilirea funcțiilor dereglate datorită substanțelor de origine vegetală și minerală, care intră în componența medicamentului.

Indicații terapeutice

Amigdalite de diferite tipuri și diversă etiologie. Tonzilită cronică în acutizare. Intoxicație tonzilogenă și diverse complicații, care au apărut în rezultatul tonzilitei cronice (inclusiv miocardiopatia).

Doze și mod de administrare

Doza la o priză: adulți și copii peste 6 ani - câte 1 comprimat, sugarilor și copiilor sub 1 an - câte 1/4 comprimat, copii de la 1 an până la 3 ani – câte 1/2 comprimat triturat în pulbere și dizolvat într-o linguriță cu apă, de la 3 până la 6 ani – câte 3/4 comprimat. Comprimatele se administrează sublingual de 3 ori pe zi, cu 15-20 minute până la masă sau peste o oră după luarea meselor.

În caz de debut acut al maladiilor în primele 2 ore preparatul se administrează în dozele recomandate fiecare 15 minute.

Durata tratamentului: 1-3 săptămâni.



Handwritten signature in blue ink.

Reacții adverse

În unele cazuri sunt posibile reacții alergice la componentele preparatului la persoane cu hipersensibilitate la plante din familia Asteraceae (de exemplu arnica).

În caz de apariție a oricăror manifestări neobișnuite e necesar de consultat medicul.

Contraindicații

Hipersensibilitate la componentele preparatului.

Supradozaj

Nu sunt relatate cazuri de supradozaj.

Atenționări și precauții speciale de utilizare

Acest medicament conține lactoză. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Administrarea în sarcină și perioada de alăptare

Nu este contraindicat.

Influența asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu are influența asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Interacțiuni cu alte medicamente, alte tipuri de interacțiuni

Este compatibil cu alte medicamente.

Prezentare, ambalaj

Câte 50 comprimate sublinguale în flacon de masă plastică. Câte 1 flacon împreună cu instrucțiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.

Păstrare

A se păstra la temperatura sub 25 °C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

Termen de valabilitate

5 ani.

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

Statutul legal

Fără prescripție medicală.

Data ultimei revizuirii a textului

Martie 2012.

Numele și adresa producătorului

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

***La apariția oricărei reacții adverse informați secția de farmacovigilență a Agenției
Medicamentului (tel. 73-70-02)***

