

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

GRIPP-HEEL®
comprimate sublinguale

**Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova: nr. 18007 din 23.07.2012**

Denumirea comercială
Gripp-Heel®

Compoziția

1 comprimat sublingual conține:

substanțe active: Aconitum napellus D4 120 mg, Bryonia D4 60 mg, Eupatorium perfoliatum D3 30 mg, Lachesis D12 60 mg, Phosphorus D5 30 mg;
excipienți: stearat de magneziu, lactoză.

Forma farmaceutică

Comprimate sublinguale.

Descrierea medicamentului

Comprimate rotunde cu margini teșite, de culoare de la alb până la galben-pal, se admite incluziuni negre și galbene, fără miros.

Grupa farmacoterapeutică

Preparat homeopat.

Proprietăți farmacologice

Preparatul posedă acțiunea antiinflamatoare, imunomodulatoare și dezintoxicantă. Acțiunea preparatului se bazează pe stimularea rezistenței organismului și restabilirea funcțiilor dereglate datorită substanțelor de origine vegetală, minerală și animală din compoziția preparatului.

Indicații terapeutice

În cadrul tratamentului complex al gripei, paragripei, IRVA și în profilaxia lor; altor infecții și afecțiuni inflamatorii acute, însoțite de intoxicație.


Doze și mod de administrare

Doza la o priză: adulți și copii peste 6 ani – câte un comprimat, sugari și copii sub 1 an – câte 1/4 comprimat, copii de la 1 an până la 3 ani – câte 1/2 comprimat triturat în pulbere și dizolvat într-o linguriță cu apă, de la 3 până la 6 ani – câte 3/4 comprimat. Comprimatele se administrează sublingual de 3-5 ori pe zi, cu 15-20 minute până la masă sau peste o oră după luarea meselor.

În caz de debut acut al maladiilor în primele 2 ore preparatul se administrează în dozele recomandate fiecare 15 minute, ulterior se continuă conform regimului uzual.

Durata tratamentului este de 5-10 zile.

După ameliorarea simptomelor se recomandă de administrat încă 5-7 zile.



[Handwritten signature]

Pentru profilaxia gripei și infecțiilor respiratorii virale acute în perioada de toamnă/iarnă preparatul se administrează de 1-2 ori pe zi în doze conform vârstei.

Reacții adverse

Nu sunt cunoscute.

Contraindicații

Nu sunt cunoscute.

Supradozaj

Nu sunt relatate cazuri de supradozaj.

Atenționări și precauții speciale de utilizare

Acest medicament conține lactoză. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Administrarea în sarcină și perioada de alăptare

Nu este contraindicat.

Influența asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu are influența asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Interacțiuni cu alte medicamente, alte tipuri de interacțiuni

Este compatibil cu alte medicamente.

Prezentare, ambalaj

Comprimate sublinguale. Câte 50 comprimate în flacon de masă plastică. Câte 1 flacon împreună cu instrucțiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.

Păstrare

A se păstra la temperatura sub 25 °C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

Termen de valabilitate

5 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

Statutul legal

Fără prescripție medicală.

Data ultimei revizuirii a textului

Martie 2012.

Numele și adresa producătorului

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Germania



La apariția oricărei reacții adverse informați secția de farmacovigilență a Agenției Medicamentului (tel. 73-70-02)